

Πίνακας 1: Συστάσεις για τη συγχρόνηση φαρμάκων με τη νιρματρελβίρη/ριτοναβίρη

Αγγολυτικά		Αντιμικροβιακά		Αντισηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά		Διάφορα	
Διαζεπάμη	■	PAS	■	Απιζαμπάνη	■	Αλλοπουρινόλη	■
Λοραζεπάμη	■	Αμικασίνη	■	Ασπιρίνη	■	Εργομετρίνη	■
Μιδαζολάμη	■	Αμοξικιλίνη	■	Βαρφαρίνη	*	Λεβοθυροξίνη	■
		Αμπικιλίνη	■	Δαλιεπαρίνη	■	Λεβοντόπα	■
Αναλγητικά		Αμφοτερικίνη Β	■	Ενοξασπαρίνη	■		
Δικλοφενάκη	■	Βανκομυκίνη	■	Εντοζαμπάνη ^δ	■	Θεραπείες COVID	
Ιβουπροφαίνη	■	Βορικοναζόλη	*	Ηπαρίνη	■	Βουδεσονίδη	■
Κωδεΐνη	■	Γενταμικίνη	■	Κλοπιδογρέλη (stent) ^ε	■	Δεξαμεθαζόνη	■
Μεφενάμικο οξύ	■	Γκριζεοφουλβίνη	■	Νταμπιγατράνη ^ε	■	Εμβόλια	■
Μορφίνη	■	Δαψόνη	■	Ριβαροζαμπάνη	■	Ινφλιξιμάμνη	■
Οξικωδόνη	*	Δοξυκυκλίνη	■	Στρεπτοκινάση	■	Μεθιλπρεδνιζολόνη	■
Παρακεταμόλη	■	Εθαμβουτόλη	■			Πλάσμα αναρρυνουσταν	■
Τραμαδόλη	■	Εθιοναμίδη	■	Αντιρετροϊκά		Υδροκορτιζόνη	■
Υδρόξυμορφίνη	■	Ερυθρομυκίνη	*	Abacavir	■		
Φεντανύλη	*	Ιμπενέμη	■	Atazanavir/ritonavir	■	Καρδιολογικά	
		Ισοιαζίδη	■	Darunavir/ritonavir	■	Αμιλορίδη	■
Ανθελονοστικά		Ιτρακοναζόλη ^ε	■	Dolutegravir	■	Διγοξίνη	*
Αμοδιακίνη	*	Καναμυκίνη	■	Efavirenz	■	Ντοπαμίνη	■
Αρτεμεθέρας	■	Κετοκοναζόλη ^ε	■	Emtricitabine	■	Ενάλιαπρίλη	■
Αρτεσουάτη	■	Κεφαζολίνη	■	Lamivudine	■	Φουροσεμίδη	■
Ατοβακόνη	■	Κεφαλεξίνη	■	Lopinavir/ritonavir	■	Υδροχλωροθειαζίδη	■
Κινίνη	*	Κεφίξιμη	■	Nevirapine	■	Δινιτρικός Ισοσορβίτης	■
Λομεφαντρίνη	■	Κεφοταξίμη	■	Raltegravir	■	Λισινοπρίλη	■
Μεφλοκίνη	*	Κεφτριαξόνη	■	Tenofovir alafenamide	■	Λοσαρτάνη	■
Πυρακίνη	*	Κλαριθρομυκίνη ^ε	■	Tenofovir disoproxil	■	Μεθυλ-ντόπα	■
Πριμακίνη	■	Κλινδαμυκίνη	■	Zidovudine	■	Σπιρονολακτόνη	■
Προγουανίλη	■	Κλοξακιλλίνη	■			Αμλοδιπίνη	■
		Κλοφαζιμίνη	■	Αντιουληπτικά		Βεραπαμίλη	■
Ανοσοκατασταλτικά		Κυκλοσπρίνη	■	Αιθινυλοστραδιόλη	■	Νιφεδιπίνη	■
Everolimus	■	Λεβοφλοξασίνη	■	Ετονογεστρέλη εμφύτευμα	■	Ατενολόλη	■
Αζαθειοπρίνη	■	Λινεζολίδη	■	Ετονογεστρέλη κοιλική	■	Καρβεδιλόλη	■
Κυκλοσπορίνη	■	Μεραπενέμη	■	Λεβονογεστρέλη ενδομήτρια	■	Μετοπρολόλη	■
		Μετρινδαζόλη	■	Λεβονογεστρέλη επίγυσα ανατολήψη	■	Μπισοπρολόλη	■
Ανταρροθμικά		Μοξιφλοξασίνη	■	Λεβονογεστρέλη συνδυαστικό χάπι	■	Προπρανολόλη	■
Αμωδαρόνη	!	Μπεντακιλίνη	*	Λεβονογεστρέλη χάπι προγεστίνης	■	Τιμαλόλη	■
Λιδοκαΐνη	*	Νιτροφουραντοΐνη	■	Μεδροξυπρογεστερόνη	■		
		Ντελαμανίδη	*	Νοργεστρέλη συνδυαστικό χάπι	■	Στεροειδή	
Αντιδιαβητικά		Νυστατίνη	■	Νορεθιστερόνη ενδομυκικά	■	Βεκλομεθαζόνη	■
Γλιβενλαμίδη	■	Οφλοξασίνη	■	Νορεθιστερόνη συνδυαστικό χάπι	■	Βηταμεθαζόνη	■
Γλικαζίδη	■	Πενικιλίνη	■	Νορεθιστερόνη χάπι προγεστίνης	■	Φλουδροκορτιζόνη	■
Ινσουλίνη	■	Πτερακυλλίνη	■			Πρεδνιζολόνη	■
Μετφορμίνη	■	Πυραζιναμίδη	■	Αντιψυχωσικά		Τεστοστερόνη	■
		Ριφαμυκίνη	■	Αλοπεριδόλη	*	Τριαμκιολόνη	*
Αντιεπιληπτικά		Ριφαμπουτίνη ^δ	*	Ρισπεριδόνη	*		
Βαλπροικό	■	Ριφαπεντίνη	■	Χλωπρομαζίνη	■	Συμπληρώματα	
Εθουσοξιμίδη	*	Σιπροφλοξασίνη	■	Κλοζαπίνη	■	Βαλσαμόχορτο (St John's wort)	■
Καρβαμαζεπίνη	■	Σουλφαδιαζίνη	■	Φλουφεναζίνη	■	Μαγνήσιο	■
Κλοναζεπάμη	■	Σπεκτινομυκίνη	■			Φυλλικό οξύ	■
Λαμοτριγίνη	■	Στρεπτομυκίνη	■	Βρογχοδιασταλτικά			
Φαινοβαρβιτάλη	■	Ταζοπακτάμη	■	Αμινοφυλλίνη	■	Υπολιπιδαιμικά	
Φανυντοΐνη	■	Τετρακυκλίνη	■	Ιπρατρόπιο	■	Ατορβαστατίνη	*
		Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξασόλη	■	Σαλμετερόλη	■	Λοβαστατίνη	■
Αντικά HCV		Φλουκοναζόλη	■			Σιμβαστατίνη	■
Glecaprevir/pibrentasvir	■	Φλουκυτοσίνη	■	Γαστρεντερολογικά		Φλουβαστατίνη	■
Ledipasvir/sofosbuvir	■	Χλωραμφενικόλη	■	Απρεπιτάνη	*		
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir	■			Δομπεριδόνη	■		
Sofosbuvir/velpatasvir	■	Αντικαταθλιπτικά		Λακτουλόζη	■		
		Αμιτριπτυλίνη	■	Λοπεραμίδη	■		
Αντικαρκινικά		Κλομιπραμίνη	■	Μεσαλαζίνη	■		
Βιμπλαστίνη ^δ	*	Λίθιο	■	Μετοκλωπραμίδη	■		
Ερλοτινίμη ^ε	*	Φλουοξετίνη	■	Ομπεπραδόλη	■		
Ιμπατινίμη ^ε	*			Ονδασεπρόνη	■		
Μεθοτρεξάτη	■			Ραντιδίνη	■		
Ντασοτινίμη ^ε	*			Σίννα	■		

**Κατηγορίες συγχορηγούμενων φαρμάκων με βάση τον κίνδυνο αλληλεπιδράσεων
(Πίνακας 1-πηγή: <https://www.covid19-druginteractions.org/>)**

✘ Απόλυτη αντένδειξη χρονο-εξαρτώμενη: εάν ο ασθενής λαμβάνει ή έχει λάβει τις τελευταίες 28 ημέρες έναν ισχυρό επαγωγέα του ενζύμου CYP3A4 (ενδεικτικά: κάποια αντιεπιληπτικά, αντινεοπλασματικά φάρμακα, ή ριφαμυκίνες ή το φυτικό προϊόν βαλσαμόχορτο- St. John's wort-Hypericum perforatum).

Σύσταση: ΜΗΝ συνταγογραφείτε την νιματρελβίρη/ριτοναβίρη

⚠ Απόλυτη αντένδειξη: Εάν ο ασθενής λαμβάνει ένα φάρμακο με μεγάλο χρόνο ημιζωής και στενό θεραπευτικό φάσμα (ενδεικτικά: κάποια αντιαρρυθμικά, ψυχιατρικά ή αντινεοπλασματικά φάρμακα) το συγχορηγούμενο φάρμακο μπορεί να παραμείνει στον ορό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τελευταία δόση και να προκαλεί αλληλεπιδράσεις με την νιματρελβίρη/ριτοναβίρη.
Σύσταση: ΜΗΝ συνταγογραφείτε την νιματρελβίρη/ριτοναβίρη ακόμα και αν διακοπεί το συγχορηγούμενο φάρμακο.

■ Σχετική αντένδειξη: Αναμένεται σημαντική αύξηση των επιπέδων του συγχορηγούμενου φαρμάκου (ενδεικτικά: κάποιες στατίνες, παράγωγα της εργοταμίνης, κολχικίνη, σιζαπρίδη, μιδαζολάμη).
Σύσταση: ΜΗΝ συνταγογραφείτε την νιματρελβίρη/ριτοναβίρη, λόγω κινδύνου σοβαρής τοξικότητας, εκτός εάν διακοπεί το συγχορηγούμενο φάρμακο. Εάν το συγχορηγούμενο φάρμακο μπορεί με ασφάλεια να διακοπεί ή να αντικατασταθεί προσωρινά, το διακόπτουμε από την πρώτη ημέρα χορήγησης νιματρελβίρης/ριτοναβίρης και το επαναχορηγούμε 3 ημέρες μετά την τελευταία δόση της νιματρελβίρη/ριτοναβίρης.

*** Προσοχή στην συγχορήγηση:** Αναμένεται αύξηση των επιπέδων του συγχορηγούμενου φαρμάκου (ενδεικτικά: κάποιες στατίνες, καρδιολογικά, αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία).

Σύσταση: Ιδανικά, να αποφεύγεται η νιματρελβίρη/ριτοναβίρη, εκτός αν το συγχορηγούμενο φάρμακο μπορεί να διακοπεί ή να αντικατασταθεί με ασφάλεια. Εναλλακτικά, ο συνταγογραφών ιατρός, ενδεχομένως με συμβουλή ειδικού, μπορεί να συγχορηγήσει το φάρμακο με τροποποίηση δοσολογίας, επίβλεψη για ανεπιθύμητες ενέργειες ή έλεγχο θεραπευτικών επιπέδων.

■ ■ ■ Επιτρέπεται η συγχορήγηση: δεν αναμένονται σημαντικές αλληλεπιδράσεις. **Σύσταση:** Συνέχιση του συγχορηγούμενου φαρμάκου χωρίς τροποποίηση της δόσης